
Protecția complexă și fertilizarea viței de vie







	Organismul nociv / obiectivul tratamentului	repaus vegetativ	dezmugurit, 3-5 frunze	5-7 frunze	înainte de înflorire	înflorire
BOLI	Mana (*Plasmopara viticola*) – pe frunze, inflorescențe și struguri			Indigo, SC 5,0 l/ha	Presto 50 WP 0,3 kg/ha	
	Făinarea (*Uncinula necator*) – pe lăstari, frunze și bobițe			Sulfomat 80 PU 3,0 kg/ha	Nimrod 250 EW 1,0 l/ha	
	Putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*) – pe inflorescențe și struguri					Kantor, SCC 2,4 l/ha
DĂUNĂTORI	Păduchele țestos, acarianul galicol, acarianul roșu comun – forme hibernante (tratament de iarnă)	Ovipron Top EC 25-35 l/ha				
	Molia verde a strugurilor (*Lobesia botrana*) – generațiile I, II și III			Caraciar, EC 0,4 l/ha	Sămpai, EC 0,4 l/ha	
	Acarieni (acarianul roșu comun, acarianul galicol al viței de vie)					
	Cicade (cicorițe) – vectori ai fitoplasmelor; afide					
FERTILIZARE FOLIARĂ	Reglează cantitatea și viabilitatea polenului, legarea uniformă a bobițelor (N 6,5%, B 15%)		Omex Foliar Boron 1,0 l/ha			
	Elimină stresul cauzat de fenomene meteo nefavorabile sau dăunători (aminoacizi 27,3%)					
	Deficitul de micronutrienți – tulburări ale fotosintezei, respirației și sintezei aminoacizilor					
	Calciu (CaO 24%, N 16%, aminoacizi 9%) – mărește perioada de păstrare a strugurilor de masă					
	Îmbunătățește gustul, dimensiunea bobițelor și durata de păstrare (N 1,8-3,4%, K_2O 20-24%)					
FERTIRIGARE	Fosfor solubil – dezvoltarea sistemului radicular, creșterea plantelor, stimularea înfloririi		Euro Fert MAP 12-61-0 10-15 kg/ha/săptămână			
	Dezvoltarea rădăcinilor și lăstarilor, formarea mugurilor și a fructelor					
	Azot nitric și calciu – fermitatea bobițelor și capacitatea de păstrare (soiurile de masă)					
	Potasiu – susține metabolismul, echilibrul hidric și imunitatea plantelor					
	Potasiu și sulf – fermitatea, densitatea și calitatea finală a producției (K_2O 50%, SO_3 18%)					
	Reface deficiențele de magneziu și sulf din sol, stimulează rădăcinile și fotosinteza (MgO 9%, SO_3 18%)		Euro Fert Sulfat de Magneziu 25-50 kg/ha/sezon – pe perioada de vegetație			



sfârșit de înflorire	10-14 zile după înflorit	creșterea bobițelor (bob de mazăre)	compactarea ciorchinelui	bobițe la mărime finală	începutul coacerii (pârgă)	maturizare, recoltare
Darius EC 0,65 l/ha	Shirma, SC 0,5 l/ha	Presto 50 WP 0,5 kg/ha	Grenni, SC 1,0 l/ha	Kaperang, SC 3,0 l/ha		
Fobos 100 EC 0,35 l/ha	Artemis 300 SC 0,3 l/ha	Domark 10 EC 0,3 l/ha	Misteria, ME 0,7 l/ha	Fram 50 WG 0,3 kg/ha		
				Pyrus 400 SC 2,0 l/ha	Insignia, OD 1,8 l/ha	
		Logus Maxx, EC 0,3 l/ha		Luxor, ME 0,4 l/ha		
Mavrik 2F 0,3 l/ha						
	Medouz, OD 0,2 l/ha		Medouz, OD 0,3 l/ha			
Omex Aminor Plus 2,0 l/ha						
		Omex Micromax 1,0 l/ha				
		Omex CalMax Gold 2,5 l/ha				
					Ultramag Caliu 3,0 l/ha	
Euro Fert NPK 20-20-20+ME 25 kg/ha/irigare						
		Nitrat de Calciu N 15%, Ca 26,5% 250 kg/ha/sezon				
					Euro Fert Nitrat de potasiu 13-0-46 15-25 kg/ha/irigare	
					Euro Fert Sulfat de Potasiu 10-15 kg/ha/săptămână	