Programul de protecţie a culturilor de cereale



	Organismul nociv	Semințe înainte de semănat	Stadiul frunzei 1-2	Stadiul frunzei a 3-a	Începutul înfrățirii	Mijlocul înfrățirii	Sfârșitul înfrățirii	Alungirea paiului	Stadiul primului nod	Stadiul celui de-al doilea nod	Frunza stindard	Înspicare	Înflorire	Coacere în ceară	Coacere deplină
Boli	Tăciunele zburător al grâului, mălura comună, fuzarioza, putregaiul rădăcinilor de cereale, mucegăirea semințelor, inclusiv alternarioza semințelor, făinarea (în primele etape ale dezvoltării)	**Benifis, ME*** 0,6-0,8 l/t **Scarlet, ME** 0,3-0,4 l/t													
	Făinarea, rugina, helmintosporoza, septorioza, fuzarioza spicelor, pirenoforoza, rinhosporioza						**Misteria, ME** 0,1,0-1,25 l/ha								
	Făinare, Septorioza, Pirenoforoza, rugina, helmintosporium, fuzarioza spicului				**Eis, SCC** 0,6-1,0 l/ha										
	Făinarea (Erysiphe graminis), septoria frunzele și spicelor (Septoria tritici), piroforoza (Helminthosporium tritici-repentis), rugina brună (Pucciniarecondita), fusarioza (Fusarium graminearum)				**Teză, SC** 0,25-0,5 l/ha										
Dăunători	Gândacul ovăzului, mușteledăunătoare ale cerealelor, ploșnița asiatică a cerealelor, tripsul grâului			**Medouz, ME** 0,3 l/ha											
	Afide Tripsul grâului Gândacul ovăzului, Ploșnițele cerealelor										**Knockout Ultra EC** 0,1-0,15 l/ha				
Buruieni	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	**Sprut Extra, SL** 1,4-4,0 l/ha													
	Buruieni dicotiledonate anuale și perene, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și MCPA				**Unico, SCC** 1,0-1,5 l/ha										
	Mușețel, susai				**Trionix, WDG** 0,04-0,06 l/ha										
	Buruieni monocotiledonate anuale									**Argo, ME** 0,7-1,0 l/ha - **Unico, SCC** 1-1.5 l/ha					
	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și MCPA				**Granat, WG** 0,015-0,025 kg/ha										
	Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și MCPA și unele perene				**Primadonnaa, SE** 0,6-0,9 l/ha		**Primadonna , SE** 0,4-0,5 l/ha **+ Granat, WG** 0,01 kg/ha								
	Erbicid sistemic contra buruenilor dicotilidonate, anuale si perene, inclusiv rezistente 2,4D si MCPA						**Glok,WDG NEW** 0,03-0,04 l/ha								
	Buruieni anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și MCPA, și dicoteledonate perene inclusiv turita, specii de susai, palamida, samurasla de f-soarelui						**Fortisimo,OD NEW** 0,5-0,7 l/ha								

Programul de protecţie a culturilor de cereale



Organismul nociv	Semințe înainte de semănat	Stadiul frunzei 1-2	Stadiul frunzei a 3-a	Începutul înfrățirii	Mijlocul înfrățirii	Sfârșitul înfrățirii	Alungirea paiului	Stadiul primului nod	Stadiul celui de-al doilea nod	Frunza stindard	Înspicare	Înflorire	Coacere în ceară	Coacere deplină
Surfactanti corectia Ph-ul apei													**Civic** 0,04-0,15 ml/100l H_2O	
Adjuvant													**Alfalip Extra** 0,20 l/ha	
Fertilizanți și regulatori de creștere Activează mecanismul natural de apărare în plante, acționând ca un biostimulant prin creșterea toleranței la dăunători și boli. Îmbunătățește înflorirea și formarea boabelor. Ajută la eliminarea stresului cauzat de fenomene meteorologice nefavorabile sau dăunători,erbicid										**OMEX Aminor** 2,0-4,0 l/ha				
Maximizarea producției culturilor agricole supuse riscurilor de la condițiile de stres cauzate de temperatură scăzută sau ridicată, condițiile de sol, umiditate și boli				**OMEX BIO** 1,5-2,5 l/ha										
Microelementele sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole.Deficitul de micronutrienți provoacă tulburări ale proceselor metabolice complexe de fotosinteză, respirație, și sinteza de aminoacizi											**OMEX Aminor +Omex Micromax** 1,5 l/ha			
Deficitul de micronutrienți provoacă tulburări ale proceselor metabolice complexe de fotosinteză, respirație, și sinteza de aminoacizi													**Omex Micromax** 1,5 l/ha	
Componenta unica asigura necesitatile cerealelor in hrana										**Omex Micromax** 1,5 l/ha				