

Programul de protecție a culturilor de floarea soarelui



	Organismul nociv	Semințe	Înainte de semănat	Semănat – până la răsărire	Răsărire	2-4 frunze adevărate 6-8 frunze adevărate	Butonizare	• Maturizarea semințelor	Maturizarea semințelor	Coacere
Boli	Pătarea brună și frângerea tulpinei florii-soarelui, putregaiul alb (forma radiculară), putregaiul fuzarian al rădăcinilor, putregaiul cenușiu (infecție seminceră)	**Scarlet, ME** 0,4 l/t								
	Putregaiurile radiculare, ascohitoza, mucegaiul semințelor	**DEPOSIT SUPRIM ME** 1,0-1,2 l/t								
	Alternaria fomopsis, fomoza, putregaiul alb, cenusiu, rugina, perenospora cercospospora					**Misteria, ME** 1,0-1,25 l/ha				
Buruieni	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene		**Sprut Extra, SL** 1,4-2,5 l/ha							
	Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene					**Granat, WG **** 0,025 kg/ha				
	Buruieni dicotiledonate anuale și perene și unele graminee anuale				**Hermes, OD*** 0,9-1,0 l/ha					
	Buruieni graminee anuale și perene				**Forvard, OEC** 0,9-2,0 l/ha					
	Dicotiledonate anuale și unele graminee. Preluarea substanței active se face prin coleoptil, hipocotil, cotiledoane și prin frunze, atunci când buruienile sunt răsărite la momentul aplicării. (ambrozia, cornuti, ardei de balta, troscot, loboda, stir, ciumafae)					**Bravura, CS** 2,0-2,5 l/ha				
Dăunători	Ratisoara porumbului, afide, gandacul pamintiu					**Caraciar Sc** 0,1-0,15 l/ha				
	Cicade, ratisoara porumbului, gandacul pamintiu, plosnita lucernei					**Medouz, OD** 0,2 l/ha				



Organismul nociv	Semințe	Înainte de semănat	Semănat – până la răsărire	Răsărire	2-4 frunze adevărate 6-8 frunze adevărate	Butonizare	• Maturizarea semințelor	Maturizarea semințelor	Coacere
Surfactanti corectia Ph-ul apei								**Civic** 0,04-0,15ml/100l H_2O	
Adjuvant								**Alfalip Extra** 0,2l/ha	
Fertilizanți și biostimulatori de creștere Activează mecanismul natural de apărare în plante, acționând ca un biostimulant prin creșterea toleranței la dăunători și boli. Îmbunătățește înflorirea și formarea boabelor. Ajută la eliminarea stresului cauzat de fenomene meteorologice nefavorabile sau dăunători, erbicid				**OMEX Aminor** 2,0-4,0 l/ha					
Deficiența de Bor, conduce la întîrzieri în creșterea și dezvoltarea plantelor. Borul are și un rol foarte important în procesul de polenizare. El este elementul care reglează cantitatea și viabilitatea grăunciorilor de polen						**Boron** 1,0-2,0 l/ha			
Asigura dezvoltarea unui sistem conducator sanatos, ridica rezistenta					**Maxplant Oil Crop** 2,0 l/ha				
Preparate microbiologice		**Biocompozit-correct**		**Biocompozit-correct**					

** Hermes, OD - hibrizi rezistenți la imazamox*

*** Granat, WG - hibrizi rezistenți la tribenuron-metil*