Programul de protecţie a culturilor de porumb










Organismul nociv	Semințe până la răsărire		Răsărire	3-5 frunze 5-7 frunze	Alungirea tulpinii	Apariția paniculului – înflorire	Formarea recoltei	Maturizare
Boli								
Tăciunele comun al porumbului, putregaiul fuzarian al rădăcinilor, putregai cenușiu (infecție semințeră)	**Scarlet, ME** 0,4 l/t							
Putregaiurile radiculare, ascohitoza, mucegaiul semințelor	**DEPOSIT SUPRIM ME** 1,0-1,2 l/t							
Dăunători								
Buha fructificațiilor, dăunători polifagi, afide, sfredelitorul porumbului, etc.					**Luxor, ME** 0,3-0,4 l/ha			
Buha bumbacului, Sfredelitorul porumbului, Omida de stepa				**Luxor, ME** 0,3-0,4 l/ha				
Ratisoara porumbului,afide,Gindacul pamintiu, omida de stepa, sfredelirtorul porumbului				**Caraciar Sc** 0,1-0,15 l/ha				
Ratisoara porumbului, afide, Gindacul pamintiu, omida de stepa, sfredelirtorul porumbului, cicade				**Knockout Ultra EC** 0,1-0,15 l/ha				
Buha bumbacului, Sfredelitorul porumbului, Omida de stepa				**Porfir SC** 0,1-0,15 l/ha				
Buruieni								
Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	**Sprut Extra, SL** 1,4-3,0 l/ha			**Octava, OD** 0,8-1,0 l/ha				
Buruieni dicotiledonate anuale, graminee anuale și perene				**Korneghi, SE** 1,75-2,0 l/ha				
Buruieni dicotiledonate anuale, inclusiv cele rezistente la 2,4-D și MCPA și unele perene				**Primadonna, SE** 0,6-0,9 l/ha				
Mușețel, susai				**Lornet, SL** 1,0 l/ha				
Buruiene anuale, perene mono si dicotilidonate, inclusiv ambrozia, palamida, volbura				**Korneghi Plus, OD NEW** 1,5-2,0 l/ha				

Programul de protecţie a culturilor de porumb










Organismul nociv	Semințe până la răsărire		Răsărire	3-5 frunze 5-7 frunze	Alungirea tulpinii	Apariția paniculului – înflorire	Formarea recoltei	Maturizare
Surfactanti corectia Ph-ul apei	**Civic** 0,04-0,15ml/100l H_2O							
Adjuvant	**Alfalip Extra** 0,2l/ha							
Fertilizanți și biostimulatori de creștere Activează mecanismul natural de apărare în plante, acționând ca un biostimulant prin creșterea toleranței la dăunători și boli. Îmbunătățește înflorirea și formarea boabelor. Ajută la eliminarea stresului cauzat de fenomene meteorologice nefavorabile sau dăunători, erbicid				**OMEX Aminor** 2,0-4,0 *l*/ra				
Maximizarea producției culturilor agricole supuse riscurilor de la condițiile de stres cauzate de temperatură scăzută sau ridicată, condițiile de sol, umiditate și boli				**OMEX BIO -15** 1,5-2,5 *l*/ra				
Zincul este cel mai important microelement pentru plantele de porumb. Carența acestuia poate duce la diminuarea producției cu până la 40%. Are rol în sinteza hormonilor de creștere, a proteinelor și a clorofilei					**OMEX Kingfol Zn** 0,5-1,0 *l*/ra			
Formula care asigura necesitatile porumbului,in hrana balansata					**Maxplant Corn** 1,5 *l*/ra			
Preparate microbiologice	**Biocompozit-correct**			**Biocompozit-correct**				