Схема гербицидной обработки, защиты и листового питания кукурузы

Препарат	Действующее вещество	Вредный объект	Норма, кг/л/га	Способ применения	Примечание
Sprut Extra	глифосат (калиевая соль) 540 г/л	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	1,4–2,8	Опрыскивание при активном росте сорняков, за 2 недели до посева кукурузы	Быстрое системное действие, до корней; оптимальная дозировка адъюванта
DEPRIMO, ME NEW	темботрион 100 г/л + йодсульфурон-метил-натрий 2 г/л + антидот ципросульфамид 40 г/л	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	0,8–1,0	В фазе 3–8 листьев культуры (ранние фазы сорняков)	Аналог по действию: Capreno / Laudis
Korneghi Plus, OD NEW	тербутилазин 250 г/л + 2,4-D (2-этилгексиловый эфир) 80 г/л + клопиралид 40 г/л + никосульфурон 30 г/л	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, включая амброзию, бодяк, вьюнок	1,5–2,0	В фазе 3–5 листьев культуры	Широкий спектр, включая поздно всходящие сорняки
Korneghi, SE	тербутилазин + 2,4-D (2-этилгексиловый эфир) + никосульфурон (250+80+30) г/л	Злаковые сорняки (однолетние/многолетние), двудольные (в т.ч. амброзия)	1,5–2,0	В фазе 3–5 листьев культуры	Высокий «экранирующий» эффект по почве
Octava, OD	никосульфурон + флорасулам (60 + 3,6) г/л	Злаковые (однолетние/многолетние) и двудольные сорняки	0,8–0,9	В фазе 3–6 листьев культуры	В смеси: Octava 0,8 + Primadonna 0,4
Primadonna, SE	2,4-D (2-этилгексиловый эфир) + флорасулам (200 + 3,7) г/л	Однолетние двудольные, включая устойчивые к 2,4-D и 2М-4Х, и некоторые многолетние	0,6–0,9	В фазе 3–5 листьев культуры; сорняки в ранней фазе	—
Alvius, OD NEW	никосульфурон 100 г/л	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	0,4–0,6	В фазе 4–8 листьев культуры (ранние фазы сорняков)	—
Biker Duo, SE	2,4-D (2-этилгексиловый эфир) + флорасулам (491,5 + 8,5) г/л	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,3–0,5	В фазе 3–6 листьев культуры	—
Logus Maxx, EC	циперметрин + эмамектина бензоат (375 + 125) г/л	Кукурузный стеблевой мотылёк, хлопковая совка (совка плодовая)	0,12–0,2	Опрыскивание в период вегетации	—

Luxor, ME	эмамектина бензоат 50 г/л	Хлопковая совка, стеблевой мотылёк, степная гусеница	0,3–0,4	Опрыскивание в период вегетации	—
Sâmpai, EC	эсфенвалерат 50 г/л	Стеблевой мотылёк, совка плодовая	0,5–1,0	Опрыскивание в период вегетации	—
Zevert 20 SC	хлорантранилипрол 200 г/л	Хлопковая совка, стеблевой мотылёк, степная гусеница	0,1–0,15	В период вегетации (2 обработки)	—
Civic	комплекс органических и неорганических кислот	Коррекция pH воды	40–150 мл/100 л воды	Улучшает растворимость СЗР и удобрений	Цвет раствора меняется: синий (~7) → зелёный (6–7) → жёлтый (~6)
Alfalip Extra	этилат нонилфенола	ПАВ / адъювант	0,20 л/га	Обеспечивает полное покрытие листовой поверхности	Повышает эффективность фунгицидов, инсектицидов и гербицидов
OMEX Aminor	аминокислоты 49,6% + микроэлементы	Биостимулятор, антистресс (в т.ч. после гербицида)	2,0–4,0	Через 5 дней после гербицида (листово)	Аминокислоты снижают стресс от гербицидов (особенно сульфонилмочевинных и гормональных)
OMEX BIO-15	NPK 15-15-15 + микроэлементы + экстракт водорослей	Повышение урожайности при стрессах (температура, почва, влажность, болезни)	1,5–2,5	Листово в фазе 4–6 листьев	Стимулирует корневую биомассу и использование влаги/питания
OMEX Kingfol Zn	Zn 70%	Дефицит цинка у кукурузы	0,5–1,0	Листово в фазе 6–8 листьев	Листовые подкормки Zn стимулируют укоренение, особенно на ранних посевах
Maxplant Corn	комплекс N + микроэлементы (Mg, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)	Сбалансированное питание кукурузы	1.5	В фазе 6–7 листьев (формирование генеративных органов), коррекция дефицита Zn	—
NPK 20-20-20 + OMEX Ami	NPK 20-20-20 + аминокислоты/микроэлементы	Стимуляция роста и развития	3,0 + 2,0	Листово в фазе 4–6 листьев	—
NPK 20-20-20 + Omex Folia	NPK + бор + магний + сера	Коррекция Mg и S, усиление фотосинтеза и корней	2,0 + 2,0 + 1,0	Листово в период формирования метёлки	Бор важен для качества пыльцы и оплодотворения, влияет на число зёрен в початке