


# Комплексная защита подсолнечника







| Вредный объект | | семена; до посева | посев – до всходов | всходы | 2-4 настоящих листьев | 4-6 настоящих листьев | 6-8 настоящих листьев | бутонизация | формирование корзинки | созревание семян | спелость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОРНЯКИ | Однолетние и многолетние, однодольные и двудольные сорняки | Спрут Экстра, ВР 1,4 - 2,8 л/га<br>Сокар 2,0-5,0 л/га | | | | | | | | | |
| | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | | Эстамп, КЭ 3,0-6,0 л/га | | | | | | | | |
| | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | | | | Болид, ВДГ 0,025-0,050 кг/га<br>Гранат, ВДГ 0,02 кг/га | | | | | | |
| | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | | Бравура, КС 3,0-4,0 л/га | | Бравура, КС 2,0-2,5 л/га | | | | | | |
| | Однолетние и многолетние двудольные сорняки, а также некоторые однолетние злаковые | | | | | Гермес, МД 0,7 - 1,0 л/га<br>Веритан 1,0 л/га | | | | | |
| | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | | | Форвард, МКЭ 0,9-2,0 л/га<br>Лобера 0,4-0,7 лга | | | | | | | |
| БОЛЕЗНИ | Фомопсис, белая гниль (прикорневая форма), серая гниль (семенная инфекция), фузариозная корневая гниль, плесневение семян | Скарлет, МЭ 0,4 л/т<br>Депозит Суприм МЭ 1,0 - 1,2 л/т | | | | | | | | | |
| | Фомоз, сухая гниль корзинок, альтернариоз, белая и серая гнили, ржавчина | | | Мистерия, МЭ 1,0 - 1,25 л/га | | | | | | | |
| | Альтернариоз, септориоз, фомопсис | | | Боливар Форте 0,75 - 1,0 л/га | | | | | | | |
| ВРЕДИТЕЛИ | Песчаный медляк, южный серый долгоносик, тля | | | Карачар, КЭ 0,10-0,15 л/га | | | | | | | |
| | Подгрызающие совки, капустная и хлопковая совки, луговой мотылёк | | | Люксор, МЭ 0,4 л/га | | | | | | | |







| Вредный объект | | семена; до посева | посев – до всходов | всходы | 2-4 настоящих листьев | 4-6 настоящих листьев | 6-8 настоящих листьев | бутонизация | формирование корзинки | созревание семян | спелость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) | Коррекция pH воды | | Цивик 0,04-0,15 мл/100л воды | | | | | | | | |
| | Адъювант | | | Альфалип Экстра 0,20 л/га | | | | | | | |
| УДОБРЕНИЯ И БИОСТИМУ- ЛЯТОРЫ РОСТА | Улучшает цветение и образование семян. Способствует снятию стресса, вызванного неблагоприятными погодными условиями или вредителями, гербицидом. | | | ОМЕКС Аминор 2,0 - 4,0 л/га | | | | | | | |
| | Стимуляция развития корневой системы и листового аппарата, повышение биомассы. Помогает растениям быстрее восстанавливаться после заморозков или сильных дождей | | | | | ОМЕКС Био-15 1,5 - 2,5 л/га | | | | | |
| | Дефицит бора приводит к задержкам в росте и развитии растений. Бор также играет очень важную роль в процессе опыления. Он является элементом, который регулирует количество и жизнеспособность пыльцевых зёрен. | | | | | ОМЕКС Фолиар Борон 1,0 - 2,0 л/га | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИ-ЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ | Многофункциональный микробиологический препарат, предназначенный для повышения плодородия почвы, защиты растений от болезней и ускорения разложения растительных остатков. Обладает азотфиксирующей, фосфатмобилизующей, ростостимулирующей и защитной (фунгицидной) активностью. | Биокомпозит-коррект | | Биокомпозит-коррект | | | | | | | |